




ВИРУС ЭБОЛА — это крайне опасный инфекционный агент, вызывающий геморрагическую лихорадку, которая характеризуется высоким уровнем смертности (до 90%). Заболевание протекает тяжело, поражая внутренние органы и вызывая множественные кровотечения.

Инкубационный период: от 2 до 21 дня.

70,8% летальность заболевания
200 чел. умирают ежедневно


Распространение заболевания



Пути передачи:

Заражение происходит при прямом контакте с поврежденной кожей или слизистыми оболочками:

- От животных: через контакт с кровью или выделениями инфицированных летучих мышей (природный резервуар), обезьян или лесных антилоп.
- От человека к человеку: через контакт с биологическими жидкостями больного (кровь, слюна, пот, моча, рвотные массы) или через загрязненные поверхности и предметы.
- Погребальные обряды: контакт с телом умершего от Эболы также является частым источником инфекции.



Основные симптомы:

- Болезнь начинается внезапно, через 2–21 день после контакта:
- Резкий подъем температуры, сильная слабость.
- Мышечная, суставная и головная боль.
- Боль в горле.
- Позже: рвота, диарея, сыпь, нарушение работы почек и печени.
- В тяжелых случаях: внутренние и внешние кровотечения.



вирус



кашель



лихорадка



сыпь



красные белки
глаз



рвота



головная боль



диарея

Лечение и профилактика:

Лечение: Специфического лекарства пока не существует, терапия направлена на поддержание водно-солевого баланса и борьбу с симптомами.

Вакцинация: Существуют разработанные вакцины (например, Ervebo), которые доказали свою эффективность в борьбе со вспышками в Африке.

Меры профилактики:

Соблюдайте гигиену: часто мойте руки с мылом или используйте спиртовые антисептики.

Избегайте контактов: не прикасайтесь к людям, у которых есть признаки заболевания, и к их личным вещам.

Безопасность питания: тщательно подвергайте мясо термической обработке, не употребляйте в пищу мясо диких животных.

Дистанция: в регионах вспышки избегайте мест массового скопления людей.

Основные факты



Всемирная
организация
здравоохранения

Эболавиральная инфекция –
тяжелое заболевание,
которое нередко
заканчивается летальным
исходом у человека.

– Установлено, что крупные вспышки
заболевания вызываются тремя различными
вирусами: вирусом Эбола, вирусом Судан и
вирусом Бундибуджио.

– Средний коэффициент летальности при
эболавирусной инфекции составляет
порядка 50%. В ходе прошлых вспышек он
варьировался в диапазоне от 25% до 90%.

– Своевременное начало поддерживающей
терапии с регидратацией и лечением
симптомов улучшает показатели
выживаемости пациентов.

– Зарегистрированные вакцинные и
лекарственные препараты имеются только
для одного из вирусов (вируса Эболы), а для
других эболавирусов они находятся в
процессе разработки.

– Для эффективной ликвидации вспышек
заболевания требуется осуществление
комплекса различных мер: назначение
интенсивной поддерживающей терапии
заболевшим, ведение эпиднадзора за
случаями заболевания и выявление
контактных лиц, лабораторная поддержка,
обеспечение безопасного и достойного
захоронения умерших больных, в некоторых
случаях вакцинация, а также социальная
мобилизация.



Что делать, если вы почувствовали недомогание?

- Немедленно изолируйтесь от
окружающих в отдельной комнате.
- Срочно вызовите скорую помощь или
свяжитесь с медицинским учреждением
по телефону.
- Предупредите врачей, если вы посещали
страны Африки или контактировали с
приехавшими оттуда людьми в последние
21 день.

Не занимайтесь самолечением!

Министерство здравоохранения Республики
Беларусь
ГУ «Полоцкий зональный центр гигиены и
эпидемиологии»



Осторожно, Эбола! Правила вашей безопасности

